



ネオニコチノイド系農薬の危険性を、 科学者が警告しています。

日本で広く使われている「ネオニコチノイド系」の農薬や殺虫剤。その毒性と影響を科学はどこまで解明したのか——。最新の研究や規制の動向を abt が責任編集しました。ネオニコチノイドの危険性を科学的に伝える資料としてお使いください。[2016.4.8 現在]

1. ネオニコチノイドは農薬、家庭用殺虫剤、建材として、あなたの身近に迫っています。

ネオニコチノイド系農薬とは、アセタミプリド、イミダクロプリド、クロチアニジン、ジノテフラン、チアクロプリド、チアメトキサム、ニテンピラムという化合物を含む農薬です。主に昆虫に作用する強い神経毒性をもち、野菜や果樹、米、麦などの農作物向け殺虫剤成分として広く使われるようになりました。同様の毒性がある化合物フィプロニルと合わせて「浸透性殺虫剤」とも呼ばれます¹⁾。ネオニコチノイドとフィプロニルは、農薬のほかに身近な家庭用殺虫剤や建材にも含まれています²⁾。

2. ネオニコチノイドは水に溶けて植物の中に入り込み、川や海も汚染します。

農地に使われたネオニコチノイドは、水に溶けて土壌や地下水、河川、海中に広がります。環境中の濃度はあまり詳しく調べられていませんが、調査が行なわれた場所の多くでは、ネオニコチノイドとフィプロニルがはっきり検出されています¹²⁾。市場に流通する農産物にも残留している場合があります。⁶⁾⁷⁾。

3. ネオニコチノイドは長いあいだ残留し、分解されても毒性が続きます。

ネオニコチノイドは「一度使うと長く効く」ことが重宝されている殺虫剤です。とくに土壌中では数ヶ月から、場合によっては数年間も毒性が持続します。水に溶けやすい性質との相乗作用で、農地だけでなく周辺の植物、土壌、水系にも広く汚染をもたらし、毒性が蓄積する可能性があります。また、ネオニコチノイドの代謝物（環境中で分解してできた化合物）の毒性は、元の成分と同程度か、元の成分より高くなる場合もあります¹²⁾。

4. ネオニコチノイドは「害虫」以外の生きものも脅かします。

農地の外にも流出し、毒性が長期間持続するので、農薬の対象となる「害虫」以外の生物にも悪影響を及ぼします。これまで農薬の毒性を測るために使われてきた測定方法（実験室での短期毒性実験）は、一部の生物種への直接的な急性影響を測るだけで、空気や水など複数の経路を通じて幅広い生物種に与える慢性影響は測定できません¹²⁾。数多くの生きものに影響を及ぼすため、生物多様性を損ない、生態系全体を脅かすことが心配されています¹¹⁾。

5. ネオニコチノイドの毒性が生きものに与える悪影響は少ししかわかっていません。

神経毒としてのネオニコチノイドが引き起こす可能性のある慢性障害には、嗅覚や記憶の障害、生殖能力の低下、採食行動の異常と摂食量の低下、飛行困難、病気にかかりやすくなることなどが挙げられます¹²⁾。いっぽう急性毒性を見ると、ミツバチに対するネオニコチノイドの毒性は DDT の 5,000～10,000 倍というデータがあります¹⁰⁾。けれども、大多数の生物種に対する毒性はまだ調査されていません。たとえば、25,000 種いるハチ類のうち毒性試験が行なわれたのは 4 種に限られ、アブやチョウはもちろん脊椎動物に対する毒性試験データも、ほんのわずかしかなかった¹²⁾。

- ・ **ミツバチとその他のポリネーター（花粉媒介昆虫）** [12](#)、[13](#)

深刻な危険性が確認されています。野外で実際に計測される濃度で、個体の飛行能力、学習能力、採餌能力、寿命、病気への抵抗力、生殖能力に悪影響があります。マルハナバチでは、コロニー（巣の集団）全体に影響が及び、集団が大きくなる速度が遅くなって、女王バチの発生数が著しく低下します。

- ・ **ミミズなど陸生無脊椎生物** [12](#)

土や植物、水を通じて、低濃度でも悪影響を受けます。摂食障害などの行動異常から致死にまで及びます。

- ・ **ミジンコなど水生無脊椎動物** [12](#)

水や植物を通じて、摂食行動の異常、成長障害、行動性低下などの悪影響をこうむります。高濃度では水生昆虫の数と種類が減ってしまいます。

- ・ **鳥類ほか脊椎動物** [12](#)

おおむね影響を受けにくいとされますが、鳥類は汚染された種子を食べる危険性があり、爬虫類は餌となる昆虫が少なくなったため、個体数が減少していることがわかっています。微生物、魚類、両生類も、ネオニコチノイドに慢性的にさらされることで悪影響を受けることがわかりました。

6. 人間への悪影響も懸念されます。

ネオニコチノイドは人体への悪影響が懸念されています。たとえば、アセタミプリドとイミダクロプリドでは、記憶や学習と関わる脳と神経の発達に悪影響を及ぼすという研究結果も報告されています [15](#)、[18](#)。ヒトの尿中からアセタミプリド代謝物やチアメトキサムが検出され、記憶障害などの自覚症状を訴える人たちからは、より高い頻度で検出されたという研究もあります [16](#)。発達神経毒性についても、さらなる調査が必要です [19](#)、[20](#)。ネオニコチノイドの哺乳類への影響（とくに脳の機能と発達への影響）調査の重要性は、化学物質のリスクを減らすための課題のひとつとして、国連環境プログラム (UNEP) の年報（2013年）にも取り上げられました [17](#)。

7. 被害が起きる前に使うことで、逆に害虫被害を広げてしまう可能性があります。

ネオニコチノイド系農薬を害虫被害が生じる前に予防的に使うことによって、受粉を助けたり害虫を捕食したりする生物に深刻な悪影響を及ぼす可能性が高まります。種子を農薬でコーティングする、イネの苗土に混ぜ込むといった予防的施用 (prophylactic use) が広く行なわれることは、農薬のみに依存しない総合的病虫害管理 (Integrated Pest Management=IPM) の原則にも反し、益虫を減らして農業に悪影響を与えかねません [11](#)。

8. 各国は規制強化、日本では逆行して残留基準の緩和が行なわれています。

EUでは2013年にクロチアニジン、イミダクロプリド、チアメトキサム、フィプロニルの使用が暫定規制されました [22](#)。その後、追加の調査結果を収集して再評価中ですが、規制は維持されています [24](#)、[25](#)。フランス下院は、2018年までにネオニコチノイドを全廃する法案を可決しました [27](#)。米国では、2015年にイミダクロプリド、クロチアニジン、チアメトキサム、ジノテフランの新規登録を停止し、ハチなどへの影響に関する再評価を行なっています [23](#)。韓国や、各国の州および都市単位でも同様の措置が広がっています [26](#)。ところが日本では、2015年にアセタミプリドとクロチアニジンの残留基準値がより高く改訂されるなど、世界の動きと逆行する傾向が懸念されています [8](#)。

参考文献

■一般向けの概説・参考資料

1. アクト・ビヨンド・トラスト「[ネオニコチノイド系農薬とは？](#)」(2013/10/23)
2. アクト・ビヨンド・トラスト「[ネオニコチノイド系化学物質の国内使用に関する基礎データ](#)」(2013/5/11)
3. アクト・ビヨンド・トラストのリーフレット「[ネオニコチノイド系農薬って？](#)」(2013/10/23)
4. 国際環境 NGO グリーンピース・ジャパン「[リーフレット：みつばちをまもること＝畑とごはんをまもること](#)」(2014/4/4)
5. NPO ダイオキシシ・環境ホルモン国民会議「[新農薬ネオニコチノイドが脅かすミツバチ・生態系・人間](#)」(2012年改訂版)

■食品への残留について

6. アクト・ビヨンド・トラスト「[ネオニコチノイド系農薬残留調査レポート\(米・茶\)](#)」(2014/2/18)
7. 農林水産省「[国内産農産物における農薬の使用状況及び残留状況調査結果について](#)」(2015/3/31)
8. アクト・ビヨンド・トラスト「[ネオニコチノイド系農薬の残留基準値引き上げへ!](#)」(2015/5/21)

■毒性・生態系影響

9. 五箇公一、早坂大亮「[農薬の生態リスク評価は生物多様性を守れるか？～高次リスク評価法としてのメソコズム試験を通して～](#)」『環境毒性学会誌』 vol.16, no.2, pp.21-28 (2013)
10. L. W. Pisa et al. “[Effects of neonicotinoids and fipronil on non-target invertebrates](#)” (2014/9/17)
11. European Academies Science Advisory Council “[Neonicotinoids: European Science Academies call for debate that expands beyond bees](#)” (2015/4/8)
12. 浸透性殺虫剤タスクフォース「[浸透性殺虫剤の生物多様性と生態系への影響に関する世界的な統合評価書](#)」(2015/4/30)
13. European Food Safety Authority “[Neonicotinoids: foliar spray uses confirmed as a risk to bees](#)” (2015/8/26)
14. U.S. Environmental Protection Agency (EPA) “[EPA Releases the First of Four Preliminary Risk Assessments for Insecticides Potentially Harmful to Bees](#)” (2016/2/6)

■ヒトへの影響

15. Junko Kimura-Kuroda et al. “[Nicotine-Like Effects of the Neonicotinoid Insecticides Acetamiprid and Imidacloprid on Cerebellar Neurons from Neonatal Rats](#)” (2012/2/29)
16. Kumiko Taira et al. “[Relationship between Urinary N-Desmethyl-Acetamiprid and Typical Symptoms including Neurological Findings: A Prevalence Case-Control Study](#)” (2015/11/4)
17. United Nations Environment Programme “[UNEP Year Book 2013: Emerging Issues in Our Global Environment](#)” (2013/2/18)
18. European Food Safety Authority “[EFSA assesses potential link between two neonicotinoids and developmental neurotoxicity](#)” (2013/12/17)
19. 黒田洋一郎&木村-黒田純子「[自閉症・ADHD など発達障害増加の原因としての環境化学物質\(上\)](#)」『科学』 vol.83, no.6, pp.0694-0708 (2013)
20. 黒田洋一郎&木村-黒田純子「[自閉症・ADHD など発達障害増加の原因としての環境化学物質\(下\)](#)」『科学』 vol.83, no.7, pp.0818-0832 (2013)

■規制の動向など

21. 有機農業ニュースクリップ「[ネオニコチノイド農薬関連年表](#)」
22. アクト・ビヨンド・トラスト「[EU、ネオニコチノイド系農薬3物質の暫定使用禁止措置を正式決定!](#)」(2013/5/27)
23. United States Environmental Protection Agency “[April 2015 Letter to Registrants Announcing New Process for Handling New Registrations of Neonicotinoids](#)” (2015/4/2)
24. European Food Safety Authority “[Pesticides and bees: EFSA to update neonicotinoid assessments](#)” (2016/2/11)
25. 国際環境 NGO グリーンピース・ジャパン「[ヨーロッパのネオニコ禁は、いまだどうなっているの？ ネオニコ規制の今\(上\)](#)」(2016/2/2)
26. 国際環境 NGO グリーンピース・ジャパン「[各国のネオニコ規制はいまだどうなっているの？そして日本は？ ネオニコ規制の今\(下\)](#)」(2016/2/17)
27. アクト・ビヨンド・トラスト「[フランス下院、ネオニコチノイド5種全面禁止へ動く!](#)」(2015/3/28)